新規カチオン性 Cu ポルフィリン触媒とポリピリジルルテニウム光増感剤を共吸着した TiO₂ フォトアノードの作製と酸素生成触媒機能

(九大院理¹) ○Xin Yan,¹ 酒井 健,¹ 小澤 弘宜¹

Photoelectrocatalytic Water Oxidation Performance of the TiO₂ Photoanode Modified with Novel Cationic Cu Porphyrin and Polypyridyl Ruthenium Photosensitizer

(Kyushu Univ.¹) ○Xin Yan,¹ Ken Sakai,¹ Hironobu Ozawa¹

Recently, we have achieved the second highest solar-to-hydrogen conversion efficiency by using the molecular-based TiO₂ photoanode modified with both a polypyridyl ruthenium photosensitizer (**Ru-qpy**) and a Ru(bda)-type water oxidation catalyst (**WOC**). Nevertheless, photoelectrocatalytic performance of the TiO₂ photoanode is found to gradually decrease with time due to the desorption of the multi-electron-oxidized species of Ru(bda)-type **WOC**. In this study, a novel cationic copper porphyrin **WOC** with a pyridyl anchor (**CuP(Hpy)₃-py**) has been synthesized to further improve the long-term stability of the TiO₂ photoanode. Photoelectrocatalytic performance of the TiO₂ photoanode modified with both **Ru-qpy** and **CuP(Hpy)₃-py** will be presented.

Keywords: solar water splitting; copper porphyrin; water oxidation; photosensitizer; TiO₂ photoanode

最近我々は、ピリジルアンカーを有するポリピリジルルテニウム光増感剤(**Ru-qpy**、図 1)と Ru(bda)型酸素生成触媒(Ru(bda)-py、bda = 2,2'-bipyridine-6,6'-dicarboxylic acid)を共吸着した TiO₂ 電極をフォトアノードとして用いた分子性光電気化学セルにおいて、非常に高い太陽光-水素変換効率を達成することに成功した。^[1]

一方、この TiO₂ フォトアノードにおいては、多電子酸化された Ru(bda)-py が TiO₂ 表面から脱離することによって光触媒機能が徐々に低下することも明らかとなっている。本研究では、カチオン性 Cu ポルフィリン CuPTMpy (PTMpy = meso-tetra(4-N-methylpyridyl)porphyrinato)^[2]が高い酸素生成触媒機能だけでなく高い安定性も併せ持つことに着目し、ピリジルアンカーを有し、かつ高い疎水性を示す新規カチオン性 Cu ポルフィリン酸素生成触媒 (**CuP(Hpy)₃-py**、図 1)の合成を行った。講演では、**CuP(Hpy)₃-py** と **Ru-qpy** を共吸着させた TiO₂ フォトアノードの光酸素生成触媒機能について発表する予定である。

図 1. **Ru-qpy** と **CuP(Hpy)₃-py** の構造

[1]. X. Yan, K. Sakai, H. Ozawa, *ACS Catal.*, **2023**, *13*, 13456.

[2]. Y. J. Liu, Y. Z. Han, Z. Y. Zhang, W. Zhang, W. Z. Lai, Y. Wang, R. Cao, *Chem. Sci.*, **2019**, *10*, 2613.