フタロシアニン・ポルフィリン発光体からの円偏光電界発光 (CPEL)

(近畿大学¹・大阪公立大学²・日本分光株式会社³) 鈴木 聖香¹・山本 優太¹
・志倉 瑠太²・鈴木 仁子³・八木 繁幸²・○今井 喜胤¹

Circularly polarized electroluminescence (CPEL) from phthalocyanine and porphyrin luminescent materials (¹Graduate school of science and engineering, Kindai University, ²Graduate school of engineering, Osaka Metropolitan University, ³JASCO) Seika Suzuki,¹ Yuta Yamamoto,¹ Ryuta Shikura,² Satoko Suzuki,³ Shigeyuki Yagi,² ○Yoshitane Imai¹

Circularly polarized organic light-emitting diodes (CP-OLEDs) were prepared using achiral phthalocyanine and porphyrin luminophores. By applying an external magnetic field and voltage to these CP-OLEDs, magnetic circularly polarized electroluminescence (MCPEL) from these CP-OLEDs was successfully extracted.

Keywords : Circularly polarized electroluminescence (CPEL), Circularly polarized luminescence (CPL), CP-OLED, Phthalocyanine, Porphyrin

円偏光発光(Circularly polarized luminescence: CPL)は、基本的に、キラルな発光体から取り出すことができるが、外部磁場を印加することによっても、円偏光発光を生じさせることが可能である。これを磁気円偏光発光(Magnetic circularly polarized luminescence: MCPL)という。MCPLの大きな特徴は、外部磁場という物理的刺激を用いるため、発光体にキラリティーが無くてもCPLを生み出すことができる点である

当研究室では、有機ELディスプレイ用の燐光材料として利用可能なイリジウム錯体、白金錯体、TADF発光体に注目し、外部磁場を印加することで、RGBYのマルチカラーMCPLの発現に成功している。¹⁾

本研究では、Platinum octaethylporphyrin (**Pt-OEP**)を発光層に組み込み込んだ磁気円偏光有機発光ダイオード(MCP-OLED)と、Magnesium phthalocyanine(**Pc-Mg**)を発光層に組み込み込んだMCP-OLEDを作成した。

続いて、電圧と外部磁場を印加することで、それらデバイスの磁気円偏光電界発光(MCPEL)特性について検討した。Pt-OEPを発

光層に含むMCP-OLEDからは、 $|g_{MCPEL}|10^{-3}$ オーダーで、赤色のMCPELを取り出すことに成功した。さらに、Pc-Mgを発光層に含むMCP-OLEDからは、 $|g_{MCPEL}|10^{-3}$ オーダーで、近赤外のMCPELを取り出すことに成功した。

以上、Pt-OEPおよびPc-Mgを発光層に組み込んだMCP-OLEDの開発に成功した。

1) *ChemPhotoChem.*, **5** (2021) 969. *ChemPhotoChem.*, **6** (2022) e202100253. *Org Electron.*, **119** (2023) 106814. *Org Electron.*, **122** (2023) 106893. *Front. Chem. Nanoscience.* **11** (2023) 1281168.