相互作用部位を導入したポルフィリン Au^{III} 錯体のイオンペア集合化

(立命館大生命科学) ○岡本 花道・羽毛田 洋平・前田 大光

Ion-Pairing Assembly of Porphyrin Au^{III} Complexes with Interaction Sites (*College of Life Sciences, Ritsumeikan University*) ○Hanamichi Okamoto, Yohei Haketa, Hiromitsu Maeda

π -Electronic ion pairs form a variety of assembled structures based on the shapes and electronic states of constituent charged π -electronic systems. Introduction of interaction sites into charged π -electronic systems enables the modulation of ion-pairing assembly structures and electronic properties via $i\pi-i\pi$ interactions and other interactions. In this study, porphyrin Au^{III} complexes with halogen units as interaction sites at *meso*-positions were synthesized. Single-crystal X-ray analysis of the PCCp⁻ ion pair revealed the formation of charge-by-charge assembly via $i\pi-i\pi$ and halogen-bonding interactions.

Keywords : ion-pairing assemblies; ion pairs; charged π -electronic systems; π -electronic cations

荷電 π 電子系は静電力と分散力がおもに寄与する $i\pi-i\pi$ 相互作用によってイオンペア集合体を形成する。¹⁾ 一方、荷電 π 電子系の周囲に相互作用部位を導入することで、荷電 π 電子系の配列制御が期待される。本研究では、メゾ位ハロゲン置換ポルフィリン Au^{III} 錯体を合成し、イオンペア集合体の形成によって、周辺置換基の相互作用に起因した集合体構造の解明をめざした (Fig. 1a)。ジブロモポルフィリン **1**²⁾ を AgOTf 存在下、KAuCl₄·nH₂O で処理することで Au^{III} 錯体イオンペア **1Au⁺-OTf** を得た。イオン交換樹脂を用いて Cl⁻イオンペアとしたのち、NaPCCp とのイオンペアメタセシスによって **1Au⁺-PCCp⁻** を得た。単結晶 X 線構造解析より **1Au⁺-PCCp⁻** は電荷積層型集合体を形成することが分かった (Fig. 1b)。積層構造における平均面間距離は 3.43/3.46 Å であり、 $i\pi-i\pi$ 相互作用が示唆された。**1au⁺** 平面に対して水平方向に配置する PCCp⁻ ではメゾ位 Br と N 間の距離は 3.15 Å であり、イオンペア集合体においてハロゲン結合の形成が示唆された。

Fig. 1

1) Haketa, H.; Yamasumi, K.; Maeda, H. *Chem. Soc. Rev.* **2023**, 52, 7170.

2) Vinogradova, E. V.; Enakieva, Y. Y.; Gorbunova, Y. G.; Tsivadze, A. Y. *Prot. Met. Phys. Chem. Surf.* **2009**, 45, 529.