トリチルカチオン触媒とヒドロシランを用いた *O,S*-アセタールの還元によるスルフィド合成法の開発

(東理大創域理工) ○潮田 昂生・石田 健人・坂井 教郎

Development of sulfide synthesis by reduction of *O,S*-acetal using a trityl cation catalyst and a hydrosilane (*Faculty of Science and Technology, Tokyo University of Science*) ○Koki Ushioda, Kento Ishida, Norio Sakai

Sulfides are useful compounds, and the development of their synthetic methods is an important issue. One of the method is the reduction of *O,S*-acetals, but there are few examples because of their low availability. Limiting the reaction to those using hydrosilane and Lewis acids, there are reports by Mukaiyama group using indium chloride^{1,2)} and by our group using indium bromide³⁾. In this study, we focused on the trityl cation as a Lewis acid and investigated the synthesis of sulfides. As a result, we found that the desired reduction of *O,S*-acetal proceeded in the presence of a trityl cation catalyst and a hydrosilane.

Keywords : trityl cation; hydrosilanes; *O,S*-acetals; sulfides

スルフィドは有用な化合物であり、その合成法の開発は重要な課題である。スルフィドの合成手法として、ジチオアセタールの還元や *O,S*-アセタールの還元反応が挙げられるが、*O,S*-アセタールに関しては原料がやや特殊であるために例が少ない。ヒドロシランとLewis酸を用いた反応に限定すると、向山らの塩化インジウムを用いた報告^{1,2)}と、我々の臭化インジウムを用いた報告³⁾がある。今回我々は、Lewis酸としてトリチルカチオンに着目し、スルフィド合成について検討した。

O,S-アセタール **1a** とフェニルシラン **2** の塩化メチレンの混合溶液に対し、触媒量のトリチル塩 ($(p\text{-MeOC}_6\text{H}_4)_3\text{C}^+\text{SbF}_6^-$) を加え、室温で反応を行ったところ、目的のスルフィド **3a** が得られることがわかった。続いて、同様の反応条件にて **1b** を用いて反応を行ったところ、スルフィド **3b** が収率良く得られた。

- Mukaiyama, T.; Ohno, T.; Nishimura, T.; Han, J. S.; Kobayashi, S. *Chem. Lett.* **1990**, *64*, 2239–2242.
- Mukaiyama, T.; Ohno, T.; Nishimura, T.; Han, J. S.; Kobayashi, S. *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **1991**, *64*, 2524–2527.
- Miyazaki, T.; Kasai, S.; Ogiwara, Y.; Sakai, N. *Eur. J. Org. Chem.* **2016**, 1043–1049.