

若手の会 ポスター発表 | 若手の会ポスター発表

📅 2025年8月28日(木) 9:00 ~ 18:00 📍 ポスター2Fロビー(2F ロビー)

[P001-P057] 「若手の会」および「国際ポスター賞」

8月28日(木) 9:00~18:00 (17:30撤収)

8月28日(木) 13:15~14:00 討論タイム (ポスター番号偶数番号)

8月28日(木) 14:00~14:45 討論タイム (ポスター番号奇数番号)

[P021] 市販菓子類中のグリシドール脂肪酸エステル含有量の実態調査*梅田 凌太¹、島村 裕子¹、増田 修一¹ (1. 静岡県立大・院・薬食生命科学)

キーワード：グリシドール脂肪酸エステル、菓子類、食用油

【目的】

グリシドール脂肪酸エステル (glycidyl fatty acid esters; GEs) は、生体内においてリパーゼの作用により、発がん物質であるグリシドールが遊離する。GEsの摂取暴露源として、食用油やそれらを含有する食品が考えられているが、食品中の含有量に関するデータは限定的であり、ヒト暴露量を推定する上では不十分である。そこで、本研究では、GEsを多く含有する食品を明らかにすることを目的に、市販菓子類中のGEs含有量を測定した。また、食用油を用いて、加熱処理によるGEsの分解および生成等の挙動について解析した。

【方法】

市販菓子類(揚げ菓子)を測定対象試料とした。各試料は、ミキサーで攪拌後に凍結乾燥した後、ジエチルエーテルを用いたソックスレー抽出により脂質を抽出した。脂質は、逆相および順相固相カラムを用いて前処理を行った。前処理後の試料中のGEs(パルミチン酸、ステアリン酸、オレイン酸、リノール酸およびリノレン酸グリシジル)量をLC-MS/MSを用いて測定した。また、食用油にGEsを添加して180℃で加熱し、経時的なGEs量の変化を測定した。

【結果】

GEsは、いずれの菓子類からも検出され、特に、ポテトチップスは検出限界以下から4895.7 mg/kg、煎餅は674 mg/kgから1568.3 mg/kgの範囲で検出され、これまでに報告のある食品と比較して、高濃度に含有されていた。各菓子類に含有するGEsの脂肪酸の種類は、菓子類により異なっており、また、菓子類中の脂質含有量とGEs含有量に関連性は認められなかった。食用油にGEsを加えて180℃で加熱処理したところ、時間経過に伴いGEs量は増減した。今後、さらに様々な食品中のGEs量を測定して、GEsの摂取暴露源を明らかにすることで、ヒトに対するリスク低減およびその施策が期待される。